

Số: 3655/BYT-AIDS
V/v áp dụng tiêu chuẩn điều trị
HIV/AIDS mới

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2015

Kính gửi: Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để mở rộng điều trị HIV/AIDS trên toàn quốc và áp dụng tiêu chuẩn điều trị mới, Bộ Y tế đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS, các Bệnh viện, Trung tâm Y tế huyện, thị trên địa bàn thực hiện điều trị bằng thuốc ARV cho người bệnh HIV/AIDS theo các nội dung dưới đây:

1. Tiêu chuẩn bắt đầu điều trị ARV

Đối tượng	Chỉ định điều trị ARV
Người lớn và trẻ ≥ 5 tuổi	CD4 ≤ 500 tế bào/mm ³
	Điều trị không phụ thuộc số lượng tế bào CD4 trong trường hợp: - Giai đoạn lâm sàng 3 hoặc 4 bao gồm mắc bệnh lao; - Đồng nhiễm vi rút viêm gan B, C; - Phụ nữ mang thai và phụ nữ đang cho con bú nhiễm HIV; - Người nhiễm HIV có vợ/chồng hoặc bạn tình không bị nhiễm HIV; - Người nhiễm HIV thuộc các quần thể nguy cơ bao gồm: người tiêm chích ma túy, người bán dâm, nam quan hệ tình dục đồng giới; - Người nhiễm HIV ≥ 50 tuổi; - Người nhiễm HIV sinh sống, làm việc tại khu vực miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.
Trẻ dưới 5 tuổi	- Bắt đầu điều trị ARV cho tất cả các trẻ em nhiễm HIV không phụ thuộc giai đoạn lâm sàng và số lượng tế bào CD4 - Bắt đầu điều trị ARV đối với trẻ < 18 tháng tuổi có xét nghiệm PCR dương tính hoặc xét nghiệm kháng thể kháng HIV dương tính và có biểu hiện sau: nấm miệng, viêm phổi nặng, nhiễm trùng nặng hoặc bất kỳ bệnh lý nào của giai đoạn AIDS.

2. Các phác đồ điều trị ARV bậc 1

2.1. Người lớn và trẻ em ≥ 10 tuổi (Bao gồm phụ nữ mang thai nhiễm HIV)

2.1.1. Phác đồ chính

TDF + 3TC + EFV

Ưu tiên dùng dạng thuốc viên hỗn hợp (FDC) để người bệnh dễ sử dụng và dễ tuân thủ.

2.1.2. Phác đồ thay thế:

- Nếu có chống chỉ định sử dụng TDF thay thế bằng AZT.
- Nếu có chống chỉ định sử dụng EFV thay thế bằng NVP.
- Có thể sử dụng Emtricitabine (FTC) thay thế cho 3TC.

Lưu ý: Trẻ em ≥ 10 tuổi nhưng có cân nặng dưới 35 kg sử dụng phác đồ theo điểm 2.2.1

2.2. Trẻ em từ 3 đến 10 tuổi

2.2.1. Phác đồ chính

ABC + 3TC + EFV

2.2.2. Phác đồ thay thế

- Nếu có chống chỉ định sử dụng ABC thay thế bằng AZT.
- Nếu có chống chỉ định sử dụng EFV thay thế bằng NVP.
- Emtricitabine (FTC) có thể dùng để thay thế cho 3TC.

2.3. Trẻ em dưới 3 tuổi

2.3.1. Phác đồ chính

ABC + 3TC + LPV/r

2.3.2. Phác đồ thay thế

- Nếu có chống chỉ định sử dụng ABC thay thế bằng AZT.
- Nếu có chống chỉ định sử dụng LPV/r thay thế bằng NVP.

Tiêu chuẩn điều trị HIV/AIDS trên sẽ thay thế cho tiêu chuẩn điều trị theo Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị HIV/AIDS ban hành tại Quyết định số 3003/QĐ-BYT ngày 19/8/2009 và Quyết định số 4139/QĐ-BYT ngày 2/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Thông tin liên hệ: Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Phòng Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS), 135/3 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại 043.7367144, email: dieutrivaac@gmail.com

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (để biết);
- Các Viện, Bệnh viện trực thuộc Trung ương (để biết);
- Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS 63 tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, AIDS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

